

PAKENDI INFOLEHT

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Imdur ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne ravimi Imdur kasutamist
3. Kuidas ravimit Imdur kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Ravimi Imdur säilitamine
6. Lisainfo

IMDUR (Durules) 60 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid
Isosorbiid-5-mononitraat

- **Toimeaine** on isosorbiid-5-mononitraat
- **Abiained** on naatriumalumiiniumsilikaat, parafiin, hüdroksüpropüütselluloos, magneesiumstearaat, kolloidne ränidioksiid, hüpromelloos, makrogool, värvaine titaandioksiid (E171), kollane värvaine raudoksiid (E172)

1. MIS RAVIM ON IMDUR JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Imdur(Durules) 60mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on kollased, ovaalsed, poolitusjoonega ja märgistatud A/ID, 7 x 13 mm.

Imdur'i toimeaine on paigutatud Durules-tüüpi tabletti, mis vabastab seda kontrollitult pika aja jooksul. **Imdur** Durules-tüüpi tableti toestik ei lahustu seedemahlade toimel, kuid laguneb üldjuhul sooleperistaltika toimel pärast seda kui kogu toimeaine on sellest vabanenud.

Imdur Durules tabletid tagavad ravimi ühtlase toime kogu päeva jooksul.

Imdur'i toimeaine isosorbiid-5-mononitraat kuulub nitraatideks kutsutavate ravimite rühma. Ravim lõõgastab veresoonte seintes asuvaid silelihaseid laiendades artereid ja veene. Sellega paraneb verevool ja väheneb koormus südamele.

Imdur on näidustatud füüsilisest koormusest või stressist põhjustatud südame ja rindkere valude ärahoidmiseks (stenokardia profülaktiline ravi).

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE RAVIMI IMDUR KASUTAMIST

Ärge võtke ravimit Imdur

- kui olete ülitundlik isosorbiid-5-mononitraadi või ravimi mõne koostisosa suhtes. Seepärast teavitage oma arsti, kui teil on esinenud ebatavalisi reaktsioone ravimite kasutamisel.

- kui teil on madal vererõhk või muud südameprobleemid.

Imdur'i manustamisega samaaegselt ei tohi kasutada erektsioonihäirete raviks kasutatavaid fosfodiesterasid tüüp 5 inhibiitoreid, nt Viagrat (sildenafil), Levitrat (vardenafiil) ja Cialist (tadalafiil).

Imdur ei ole näidustatud ägedate rinnaangiini hoogude raviks. Ägeda hoo korral kasutage nitroglütseriini nagu teie arst on soovitanud.

Ärge andke ravimit **Imdur** lastele.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Imdur

Mõningatel juhtudel tuleb **Imdur**'i kasutamisel olla eriti ettevaatlik. Seepärast teavitage alati oma raviarsti ka teistest terviseprobleemidest, eriti kui need on seotud südame või madala vererõhuga.

Rasedus

Enne ravi alustamist teavitage oma arsti kui olete rase või kavatsete rasestuda.

Ärge kasutage ravimit **Imdur** raseduse ajal, tehke seda ainult juhul kui teie arst seda teile soovib. Kui rasestute **Imdur**'i kasutamise ajal, teavitage sellest kohe oma arsti.

Imetamine

Enne **Imdur**'i kasutamist teavitage oma arsti kui toidate last rinnapiimaga.

Ärge kasutage ravimit **Imdur** rinnapiimaga toitmise ajal, tehke seda ainult juhul kui arst seda teile soovib.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Alustades ravi **Imdur**'iga võite tunda peapööritust. Seega selgitage enne auto juhtimist või seadmete käsitlemist alustamist välja, milline on **Imdur**'i toime teile.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Ravimit **Imdur** ja erektsioonihäirete raviks kasutatavate fosfodiesterasid tüüp 5 inhibiitorite nagu Viagra (sildenafil), Levitra (vardenafiil) ja Cialise (tadalafiil) samaaegsel kasutamisel võivad tekkida tõsised kõrvaltoimed. Ravimi **Imdur** manustamisega samaaegselt ei tohi nimetatud ravimeid kasutada.

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid

3. KUIDAS RAVIMIT IMDUR KASUTADA

Manustage ravimit alati vastavalt arsti ettekirjutusele. Kui te ei ole kindel, kuidas ravimit manustada, küsige nõu oma arstilt või apteekrilt. Ravimit **Imdur** võib võtta koos toiduga või tühja kõhuga.

Toimeaine pikenenud vabanemisega tabletid on poolitusjoonega ning neid saab hõlpsasti poolitada. Poolitatud või poolitamata **Imdur**'i tablette ei tohi närida ega purustada ja need

tuleb alati alla neelata tervelt, koos poole klaasi vedelikuga.

Imdur'i tavaline annus on 60 mg ühe annusena hommikul. Vajadusel võib teie arst suurendada annust kuni 120 mg-ni ühekordse annusena hommikul.

Teie arst võib otsustada ravi alustada väiksema annusega - 30 mg ööpäevas esimestel 2...4 ravipäeval, vähendamaks peavalu tekkimise võimalust.

Tablett on lahustumatu toestikuga, mis laguneb toimeaine vabanemise järgselt. Harva võib tableti toestik lagunemata läbida seedekulgla ja sattuda väljaheitesse, kuid seejuures on toimeaine sellest täielikult vabanenud.

Imdur'i annust ei pea eakatele patsientidele kohandama, juhul kui seda ei tingi madal vererõhk.

Kui teile tundub, et **Imdur**'i toime on liiga tugev või liiga nõrk pidage nõu oma arstiga.

Kui te manustate ravimit Imdur rohkem kui ette nähtud

Kui olete sisse võtnud rohkem **Imdur**'i kui oleks pidanud, võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.

Üleannustamise tunnused on: pulseeriv peavalu, erutus, punetus, külm higi, pearinglus, iiveldus, oksendamine; tunne, et liigute ise või et liigub ümbrus, teadvuse kadu, südame löögisageduse kiirenemine. Seetõttu on väga oluline, et te võtaksite arsti poolt määratud annuseid. Kui ilmneb mõni nendest nähtudest, kutsuge viivitamatult arst.

Kui te unustate ravimit Imdur võtta

Ärge võtke kahekordset annust, et manustada unustatud annust. Kui te unustate **Imdur**'i manustamata ja see tuleb teile meelde järgneva nelja tunni jooksul, siis võtke unustatud tablett ning jätkake seejärel regulaarset raviskeemi.

Kui möödab enam kui neli tundi, siis oodake ning võtke järgmine annus õigel ajal.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõigil ravimitel esineb ka **Imdur**'il kõrvaltoimeid. Soovimatud kõrvaltoimed mööduvad harilikult ravi jätkamisel. Ravi alustamisel võib tekkida peavalu. Harva on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest: madal vererõhk koos pearingluse ja iivelduse nähtudega ning südame löögisageduse tõus. Harva on täheldatud ka minestamist, oksendamist, kõhulahtisust, nahalöövet ja sügelust. Üksikutel juhtudel on ilmnenud lihasvalu.

Kui Teil tekib mõni nendest kõrvaltoimetest ning need kõrvaltoimed on püsivad, palun rääkige sellest kindlasti oma arstile.

Kui märkate kõrvaltoimeid, mida ei ole siin infolehes mainitud, rääkige sellest kindlasti oma arstile.

5. RAVIMI IMDUR SÄILITAMINE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoida ravimit **Imdur** originaalpakendis.

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

6. LISAINFO

Müügiloa hoidja ja tootja:
AstraZeneca AB
S-151 85 Södertälje
Rootsi

Tootjad:
AstraZeneca GmbH
Otto-Hahn Str.
68723 Plankstadt
Saksamaa

AstraZeneca AB Umea
Mariehemsvägen 8, S-901 07
Umea
Rootsi

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AstraZeneca
Järvevana tee 9
11314 Tallinn
Tel: (0) 6549

Infoleht on viimati koostöölstatud mais 2007