

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

SYMBICORT TURBUHALER 80/4,5 mikrogrammi/annuses, inhaleeritav pulber
SYMBICORT TURBUHALER 160/4,5 mikrogrammi/annuses, inhaleeritav pulber
SYMBICORT TURBUHALER 320/9 mikrogrammi/annuses, inhaleeritav pulber
Budesoniid/formoterool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Symbicort Turbuhaler ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Symbicort Turbuhaleri kasutamist
3. Kuidas Symbicort Turbuhalerit kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Symbicort Turbuhalerit säilitada
6. Lisainfo
7. Juhend "Kuidas kasutada Symbicort Turbuhalerit"

1. MIS RAVIM ON SYMBICORT TURBUHALER JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Kuidas Symbicort Turbuhaler toimib ja milleks seda kasutatakse

Symbicort Turbuhaler sisaldab kahte toimeainet – budesoniidi ja formoterooli, mis mõlemad ravivad astmat ja KOK-i erineval moel. Teie hingamisteede haigus on põhjustatud hingamisteedes olevast põletikust. Budesoniid vähendab ja hoiab ära sellise põletiku teket. Formoterooli toimel teie hingamisteed laienevad, muutes sellega hingamise kergemaks. See toime saabub 1...3 minutit pärast ravimi sisse hingamist ning kestab kuni 12 tundi. Kui te hingate läbi inhalaatori huuliku sisse, satub ravim läbi hingamisteede teie kopsudesse. Kasutusjuhendi leiate infolehe lõpust, osast "**Kuidas kasutada Symbicort Turbuhalerit**".

Symbicort Turbuhaler laiendab teie hingamisteed, mistõttu tunnete, et teil on kergem hingata. Parema ravitoime saamiseks on soovitatav kasutada Symbicort Turbuhalerit regulaarselt, ehk nii nagu arst on teile seda ette kirjutanud.

Symbicort Turbuhalerit 80/4,5 mikrogrammi/annuses kasutatakse kerge ja mõõduka astma korral, see ei sobi kasutamiseks raske astma korral.

Symbicort Turbuhalerit 160/4,5 mikrogrammi/annuses ja 320/9 mikrogrammi/annuses kasutatakse astma ja raske KOK-i raviks patsientidel, kellel esinevad korduvad ägenemised ning kellel vaatamata ravile pikatoimeliste bronhilõõgastitega (hingamisteed laiendavad ravimid) olulised haigussümptomid püsivad. Astma puhul saab arst määrata Symbicort Turbuhalerit 80/4,5 mikrogrammi/annuses ja 160/4,5 mikrogrammi/annuses kasutamiseks kahel erineval viisil:

a) Symbicort Turbuhaler ja astmahoo raviks kasutatav ravim (hooravim)

- Symbicort Turbuhalerit kasutada iga päev. See ennetab astmasümptomite tekkimist.
- Kui astmasümptomid tekivad, kasutada "hooravimit", mis muudab hingamise kergemaks.

b) Symbicort Turbuhaler on ainuke astma tõttu määratud inhalaator

- Symbicort Turbuhalerit kasutada iga päev. See ennetab astmasümptomite tekkimist.
- Kui astmasümptomite tõttu on vaja kasutada lisaannuseid, kasutada Symbicort Turbuhalerit. Eraldiseisvat “hooravimit” vaja ei ole.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE SYMBICORT TURBUHALERI KASUTAMIST

Ärge kasutage Symbicort Turbuhalerit:

- kui te olete ülitundlik (allergiline) budesoniidi, formoterooli või Symbicort Turbuhaleri mõne koostisosa suhtes.

Ärge võtke ravimit, kui ostetud pakend on katkine.

Ärge kasutage Symbicort Turbuhalerit muude haiguste ravimiseks (välja arvatud siis, kui arst seda soovitab).

Ärge kasutage teistele haigetele määratud ravimit.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Symbicort Turbuhaler:

- kui teil on kõrge vererõhk või probleeme südamega (näiteks ebaregulaarne südamerütm, väga kiire pulss, arterite kitsenemine või südamepuudulikkus);
- kui teil on suhkurtõbi;
- kui teil on kopsuinfektsioon;
- kui teil on madal kaaliumitase veres;
- kui teil esinevad häired kilpnäärme või neerupealiste talitluses;
- kui teil on rasked maksaprobleemid.

Kasutamine koos teiste ravimitega:

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rääkige kindlasti oma arsti või apteekriga, kui te kasutate mõnda järgnevatest ravimitest:

- beetablokaatorid (näiteks kõrge vererõhu raviks kasutatavad atenolool või propranolool), kaasa arvatud silmatilgad (näiteks glaukoomi raviks kasutatav timolool);
- kiire või ebaregulaarse südamerütmi tõttu kasutatavad ravimid, näiteks kinidiin;
- digoksiini-tüüpi ravimid, mida kasutatakse südamepuudulikkuse korral;
- diureetikumid (“vee väljaajamisravimid”), näiteks furosemiid, mida kasutatakse kõrge vererõhu korral;
- steroidid, mida võetakse suu kaudu, näiteks prednisoloon;
- ksantiinid (näiteks teofülliin või aminofülliin). Neid kasutatakse sageli astma ravis;
- teised bronhilõõgastid, näiteks salbutamool;
- tritsüklilised antidepressandid, näiteks amitriptülliin;
- mono-aminooksüdaasi inhibiitorid, nimetatakse ka MAO-inhibiitoriteks (näiteks fenelsiin);
- fenotiasiini tüüpi ravimid (näiteks kloorpromasiin ja prokloorperasiin);
- HIV-raviks mõeldud ravimid, mida kutsutakse proteaasi inhibiitoriteks (näiteks ritonaviir);
- seennakkuste raviks mõeldud ravimid (näiteks itrakonasool ja ketokonasool);
- parkinsonismi raviks mõeldud ravimid (näiteks levodopa);
- kilpnäärme raviks mõeldud ravimid (näiteks levotüroksiin).

Kui te kasutate mõnda neist ravimitest või kui te ei ole kindel, kas te kasutate või ei, palun rääkige enne Symbicort Turbuhaleri kasutamist oma arsti või apteekriga.

Rasedus ja imetamine

- Kui te olete rase või planeerite rasestumist, rääkige oma arstiga enne Symbicort Turbuhaleri kasutamist – kasutage Symbicort Turbuhalerit ainult juhul, kui arst seda lubab.
- Kui te rasestute Symbicort Turbuhaleri kasutamise ajal, ärge katkestage ravi Symbicort Turbuhaleriga, vaid teatage sellest oma arstile nii ruttu kui võimalik.
- Kui te toidate last rinnapiimaga, rääkige oma arstiga enne Symbicort Turbuhaleri kasutamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Symbicort Turbuhaler ei oma tõenäoliselt märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele.

Oluline informatsioon laktoosi sisalduse kohta Symbicort Turbuhaleris

Symbicort Turbuhaler sisaldab väga vähesel määral laktoosi, mis on üks suhkruliikidest. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, siis rääkige oma arstiga enne Symbicort Turbuhaleri kasutamist. Laktoosi vähenenud sisaldus ei peaks laktoositalumatusega patsientidel mingeid probleeme tekitama.

Lisaaine laktoos võib sisaldada piimavalgu jääke, mis võivad põhjustada allergilist reaktsiooni.

3. KUIDAS SYMBICORT TURBUHALERit KASUTADA

- Kasutage Symbicort Turbuhalerit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.
- Tähtis on, et te kasutaksite Symbicort Turbuhalerit iga päev, isegi kui teil ei ole astmasümptomeid.
- Teie arst kontrollib korrapäraselt, kas teil esineb astmasümptomeid.

Oluline teave astmasümptomite kohta

Kui Symbicort Turbuhaleri kasutamise ajal tekib teil ravist hoolimata õhupuudus või kiuned rinnus, jätkake Symbicort Turbuhaleri kasutamist ning samal ajal pöörduge kiiresti arsti poole, kuna te võite vaja lisaravi.

Pöörduge viivitamatult arsti poole, kui:

- teie õhupuudus süveneb või te ärkate öösiti sageli astma tõttu;
- te tunnete hommikuti pigistustunnet rinnus või kui pigistustunne rinnus kestab tavalisest kauem.

Sellised sümptomid tähendavad, et astma ei ole õigesti kontrolli all ning te vajate kohe lisa- või täiendavat ravi.

Astma

Astma puhul saab arst määrata Symbicort Turbuhalerit 80/4,5 mikrogrammi/annuses ja 160/4,5 mikrogrammi/annuses kasutamiseks kahel erineval viisil. Annuste hulk sõltub sellest, kuidas arst on ravimit teile määranud. Kui teile on määratud Symbicort Turbuhalerit ja eraldiseisvat "hooravimit", palun lugege lõiku: "a) Symbicort Turbuhaler ja eraldiseisev "hooravim"". Kui teile on astma tõttu määratud kasutada ainult Symbicort Turbuhalerit, palun lugege lõiku: "b) Symbicort Turbuhaler on ainuke astma tõttu määratud inhalaator".

a) Symbicort Turbuhaler ja astmahoo raviks kasutatav ravim (hooravim)

Kasutage Symbicort Turbuhalerit iga päev. See aitab vältida astmasümptomite teket.

Täiskasvanud (18-aastased ja vanemad):

1...2 inhalatsiooni (80/4,5 mikrogrammi/annuses; 160/4,5 mikrogrammi/annuses) kaks korda ööpäevas. Vastavalt vajadusele võib annust suurendada maksimaalselt kuni 4 inhalatsiooni kaks korda ööpäevas.

1 inhalatsioon (320/9 mikrogrammi/annuses) üks kuni kaks korda ööpäevas. Vastavalt vajadusele võib annust suurendada maksimaalselt kuni 2 inhalatsiooni kaks korda ööpäevas.

Kui sümptomid on kontrolli all, võib arst määrata ravimit üks kord ööpäevas.

Noorukid (12-17 aastased):

1...2 inhalatsiooni (80/4,5 mikrogrammi/annuses; 160/4,5 mikrogrammi/annuses) kaks korda ööpäevas.

1 inhalatsioon (320/9 mikrogrammi/annuses) üks kuni kaks korda ööpäevas.

Kui sümptomid on kontrolli all, võib arst määrata ravimit üks kord ööpäevas.

Lapsed vanuses 6-11 aastat:

1...2 inhalatsiooni (80/4,5 mikrogrammi/annuses) üks kuni kaks korda ööpäevas.

Teie arst (või astmaõde) aitab teil astmaga toime tulla. Tema määrab, milline on väikseim võimalik annus, mille puhul astma on kontrolli all. Siiski ärge reguleerige annust ilma, et oleks arstiga (astmaõega) enne rääkinud.

Kui tekivad astmasümptomid, kasutage “hooravimit”.

Kandke oma “hooravimit” alati endaga kaasas. Ärge kasutage Symbicort Turbuhalerit astmasümptomite raviks – kasutage selleks oma “hooravimit”.

c) Symbicort Turbuhaler on ainuke astma tõttu määratud inhalaator (80/4,5 mikrogrammi/annuses; 160/4,5 mikrogrammi/annuses).

Ainukese ravimina saab Symbicort Turbuhalerit kasutada ainult juhul, kui arst on teile nii määranud ning kui te olete vanem kui 18 aastat.

Kasutage Symbicort Turbuhalerit iga päev. See aitab vältida astmasümptomite teket. Te võite võtta:

- 1 annus hommikul ja 1 annus õhtul

või

- 2 annust hommikul

või

- 2 annust õhtul.

Lisaks saate võtta Symbicort Turbuhalerit nagu “hooravimit” astmasümptomite leevendamiseks, kui need tekivad.

- Kui astmasümptomid tekivad, võtke 1 annus ja oodake mõned minutid.
- Kui teie olukord ei parane, võtke veel üks annus.
- Ärge kasutage enam kui 6 annust ühe astmahoo raviks.

Kandke Symbicort Turbuhalerit alati endaga kaasas, et te saaksite seda vajadusel kasutada. **Kokku** ei ole ühes ööpäevas tavaliselt vaja manustada enam kui 8 annust. Teie arst võib teil lubada piiratud perioodi jooksul kasutada ööpäevas kuni 12 annust. Kui te kasutate ööpäevas enam kui 8 annust, palun pöörduge oma arsti (astmaõde) vastuvõtule. Teie ravi tuleb võib-olla muuta.

Ärge kasutage enam kui 12 annust 24 tunni jooksul.

Kui te teete kehalist treeningut ning teil tekivad astmasümptomid, kasutage Symbicort Turbuhalerit vastavalt ülaltoodud soovitusel. Aga ärge kasutage Symbicort Turbuhalerit astmasümptomite ennetamiseks vahetult enne kehalist treeningut.

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK)

Täiskasvanud:

Symbicort Turbuhaler (160/4,5 mikrogrammi/annuses): 2 inhalatsiooni 2 korda ööpäevas.

Symbicort Turbuhaler (320/9 mikrogrammi/annuses): 1 inhalatsioon 2 korda ööpäevas.

Kui teil on tunne, et Symbicort Turbuhaleri toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kui te kasutate Symbicort Turbuhalerit rohkem kui ette nähtud:

- Kui te kasutate Symbicort Turbuhalerit rohkem kui ette nähtud, pöörduge nõu saamiseks arsti või apteekri poole. Kõige tavalisemad üleannustamise tunnused on käteväärin, peavalu või südamepekslemine.

Enne Symbicort Turbuhaleri esmakordset kasutamist lugege hoolikalt läbi juhend “**Kuidas kasutada Symbicort Turbuhalerit**” ja järgige selles antud juhiseid.

Tähelepanu! Loputage suud pärast igakordset ravimiannuse manustamist!

Kui te unustate Symbicort Turbuhalerit manustada:

- Kui olete unustanud oma tavapärase annuse manustada, võtke see niipea, kui meelde tuleb. Aga kui on peaaegu järgmise annuse kord, pole vaja unustatud annust tagantjärele võtta.
- Ärge kahekordistage annust, et korvata ühe annuse unustamist.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Symbicort Turbuhaler põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib mõni allpool loetletud kõrvaltoimetest, katkestage Symbicort Turbuhaleri kasutamine ning pöörduge viivitamatult arsti poole:

- Näo, eriti suupiirkonna (keel ja/või kõri ja/või raskus neelamisel) turse või lööve koos hingamisraskusega (angioödeem) ja/või äkilise nõrkustundega. See võib tähendada, et teil on tekkinud allergiline reaktsioon. Seda juhtub harva, vähem kui 1 inimesel tuhandest.
- Äkiliselt tekkinud kiunud rinnus ravimi võtmisel. Seda juhtub väga harva, vähem kui 1 inimesel kümnest tuhandest.

Teised võimalikud kõrvaltoimed:

Sage (vähem kui 1 inimesel kümnest):

- südamepekslemine, värisemine või rappumine. See on tavaliselt kergekujulised ning kaob iseenesest, kui jätkate Symbicort Turbuhaleri kasutamist;
- valge katt (seennakkus suus ja neelus). Seda tavaliselt ei teki, kui pärast Turbuhaleri kasutamist suud veega loputada;
- mõõdukas kõri ärritus, ärritusköha ja häälekähedus;
- peavalu.

Aeg-ajalt (vähem kui 1 inimesel sajast):

- rahutus, närvilisus ja ängistus;
- unehäired;
- pearinglus;
- iiveldus;

- kiire südamerütm;
- nahaverevalumid;
- lihaskrambid.

Harv (vähem kui 1 inimesel tuhandest):

- lööve, sügelus;
- bronhospasm (hingamisteede lihaste krampi tõmbumine, mis tekitab kiuneid hingamisel). Kui kiuned tekivad pärast Symbicort Turbuhaleri kasutamist, katkestage selle kasutamine ning pöörduge viivitamatult arsti poole;
- madal kaaliumitase veres;
- ebaregulaarne südamerütm.

Väga harv (vähem kui 1 inimesel kümnest tuhandest):

- depressioon;
- käitumise muutused, peamiselt lastel;
- valu rinnus (stenokardia);
- suhkruisalduse tõus veres;
- maitsetundlikkuse muutused, nagu ebameeldiv maitse suus;
- vererõhu muutused.

Inhaleeritavad kortikosteroidid võivad mõjutada teie keha normaalset steroidhormoonide tootmist, eriti pikaajalisel kasutamisel suures annuses. Sellisteks toimeteks võivad muuhulgas olla:

- luude mineraalainete sisalduse muutused (luuhõrenemine);
- katarakt ehk kae;
- glaukoom (roheline kae) ehk silma siserõhu tõus;
- kasvukiiruse peetumine lastel ja noorukitel;
- toime neerupealistele (väikesed näärmed neerude piirkonnas).

Nimetatud toimed tekivad palju harvem inhaleeritavate kortikosteroidide korral võrreldes kortikosteroidi tablettidega.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. SYMBICORT TURBUHALERI SÄILITAMINE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Ärge kasutage ravimit pärast välispakendile ja inhalaatorile trükitud kõlblikkusaja lõppu.

Alati pärast Symbicort Turbuhaleri kasutamist pange inhalaatorile kate tagasi.

Ravimeid ei tohi visata ära koos majapidamisprügiga või kanalisatsiooni kaudu. Küsige apteekrilt, kuidas mittevajalikke ravimeid minema visata. See meede aitab kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Symbicort Turbuhaler sisaldab:

- **Toimeained** on budesoniid ja formoterool.
- **Abiaine on laktoosmonohüdraat.**

Kuidas Symbicort Turbuhaler välja näeb ja pakendi sisu

Symbicort Turbuhaler sisaldab valge värvusega inhaleeritavat (ehk sissehingatavat) pulbrit. Pulber sisaldab toimeainete budesoniidi ja formoterooli segu.

Symbicort Turbuhaler 80/4,5 mikrogrammi/annuses ja 160/4,5 mikrogrammi/annuses sisaldab kas 60 või 120 annust (vaata täpsustuseks etiketilt). Symbicort Turbuhaler 320/9 mikrogrammi/annuses sisaldab 60 annust. Igal Turbuhaleril on valge korpus ning punane käepide.

Symbicort Turbuhaler 80/4,5 mikrogrammi/annuses: üks sissehingatav annus sisaldab 80 mikrogrammi budesoniidi ja 4,5 mikrogrammi formoterooli.

Symbicort Turbuhaler 160/4,5 mikrogrammi/annuses: üks sissehingatav annus sisaldab 160 mikrogrammi budesoniidi ja 4,5 mikrogrammi formoterooli.

Symbicort Turbuhaler 320/9 mikrogrammi/annuses: üks sissehingatav annus sisaldab 320 mikrogrammi budesoniidi ja 9 mikrogrammi formoterooli.

Inhalaator on valmistatud plastikosadest.

Müügiloa hoidja: AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje, Rootsi

Tootjad:

- a) AstraZeneca AB, Kvarnbergagatan 12, S-151 85 Södertälje, Rootsi
- b) Corden Pharma GmbH, Otto-Hahn Str. 68723 Plankstadt, Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AstraZeneca, Järvevana tee 9, 11314 Tallinn
Tel: 6549 600

Infoleht on viimati kooskõlastatud aprillis 2010

Kuidas kasutada Symbicort Turbuhalerit

TURBUHALER on mitmeannuseline inhalaator, mille abil on võimalik väga väikseid pulbriannuseid manustada (Joonis 1). Kui te hingate läbi inhalaatori huuliku, satub pulber teie kopsudesse. Seetõttu on oluline, et hingaksite läbi huuliku **jõuliselt ja sügavalt sisse**.



Joonis 1

Uue Turbuhaleri ettevalmistamine esimeseks kasutamiseks.

Enne uue Turbuhaleri esmakordset kasutamist on vaja see ette valmistada. Ettevalmistusi pole vaja korrata juhul, kui Te olete antud Turbuhalerit juba kord kasutanud.

1. **Keerake lahti ja eemaldage ümbris.** Lahtikeeramise ajal on kuulda krõgisevat heli.
2. **Hoidke inhalaatorit püstiasendis käepide allpool (Joonis 2). Keerake käepidet mõlemale poole nii kaugele kui annab** (suund, kummale poole esimesena keerate, pole oluline). **Te peaksite kuulma klõpsu. Korrake keeramist mõlemale poole.** Teie Turbuhaler on kasutamiseks valmis.
3. Jätkake alates alltoodud 3. punktist.



Joonis 2

Inhalaatori kasutamine

Annuse manustamiseks järgige alljärgnevat juhiseid

1. Keerake lahti ja eemaldage ümbris. On kuulda krõgisevat heli.
2. **Hoidke inhalaatorit püstises** asendis, punane käepide allpool. (Joonis 2). Inhalaatori laadimiseks vajaliku annusega pöörake käepidet ühele poole ja tagasi algasendisse, kuni kuulete klõpsatust (suund, kummale poole esimesena keerate, pole oluline). Te peaksite kuulma klõpsu. Huulikut inhalaatori laadimise ajal mitte katsuda. Teie Turbuhaler on kasutamiseks valmis. Laadige Turbuhalerit ainult siis, kui teil on seda kasutada vaja.
3. **Hingake välja.** Ärge hingake välja läbi huuliku.
4. Asetage huulik õrnalt hammaste vahele, sulgege selle ümber huuled ja hingake **jõuliselt ja sügavalt** läbi suu sisse (Joonis 3). Huulikut mitte närida ega hammustada.
5. **Eemaldage huulik suust enne väljahingamist.** Sissehingatud ravimiannus on väga väike. See tähendab, et ravimi maitset ei ole tunda. Kui te olete järginud juhiseid, võite te siiski kindel olla, et te olete ravimi sisse hinganud ning see on nüüd teie kopsudes.
6. Kui on vaja rohkem kui ühte inhalatsiooni, korrake punkte 2...5.
7. Pange ümbris peale tagasi.
8. Loputage suud veega. Ärge seda vett alla neelake.



Joonis 3

Puhastamine

Puhastage huulikut hoolikalt väljast (vähemalt kord nädalas) kuiva lapiga. Huuliku puhastamiseks ei tohi kasutada vett ega muid vedelikke.

Annuse näidik

Annuse näidik (indikaator; joonis 4) annab teada, mitu annust on inhalaatorisse ligikaudu jäänud, alustades 60-st või 120-st annusest, kui inhalaator on täis. Näidik on markeeritud numbrite ja kriipsukestega. Seetõttu ei näita näidik iga üksiku annuse laadimist. Igat kümnendat annust märgib kriipsuke, igat kahekümnendat annust märgib number.

Te võite olla kindel, et annus on Turbuhaleris laaditud, isegi juhul, kui te ei märka annuse näidiku liikumist.

Viimase 10 annusel on näidikul punane taust. Kui null jõuab aknakese keskele (Joonis 5), peate te hakkama kasutama uut Turbuhalerit.

Märkus: Käepidet on võimalik keerata ka siis, kui näidiku aknakeses on null. Kuid siis lakkab näidik liikumast ning null jääb aknakesse püsima.

Inhalaatori raputamisel kuulduv heli ei tulene ravimist, vaid kuivatusainest.

Kui te kogemata laadite inhalaatorit enam kui ühe korra, saate te sisse hingamisel siiski ainult ühe annuse. Kuid annuse näidik registreerib iga laaditud annuse, hoolimata sellest, kas te olete selle inhaleerinud.



Joonis 4



Joonis 5

Pakendi hävitamine

Hoolitsege alati selle eest, et tühi Turbuhaler hävitataks nõuetele vastavalt.