

## PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

### Casodex 150, 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid Bikalutamiid

#### **Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte**

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

#### **Infolehes antakse ülevaade:**

1. Mis ravim on Casodex 150 ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Casodex 150 kasutamist
3. Kuidas Casodex 150 kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Casodex 150 säilitamine
6. Lisainfo

### **1. MIS RAVIM ON CASODEX 150 JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE**

Casodex 150 kasutatakse ainsa ravina või toetava ravina ekstrakapsulaarse (e kihnuvälise) ilma siireteta eesnäärmevähi korral lisaks radikaalsele prostatektoomiale või kiiritusravile patsientidel, kellel on kõrge risk haiguse progresseerumiseks.

### **2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE CASODEX 150 KASUTAMIST**

Casodexi ei kasutata naistel ega lastel.

#### **Ärge kasutage Casodex 150:**

- kui te olete ülitundlik (allergiline) bikalutamiidi või Casodex 150 mõne koostisosa suhtes.
- kui te põete mõnda maksahaigust.

#### **Rasedus ja imetamine:**

Ravimit naistel ei kasutata.

#### **Autojuhtimine ja masinatega töötamine:**

Casodex 150 ei tohiks mõjutada teie autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. Vaatamata sellele on mõned inimesed Casodex 150 kasutamise ajal ennast vahetevahel uimasena tundnud. Kui te tunnete end uimasena, peate masinate käsitsemisel ettevaatlik olema.

#### **Üldine teave mõningate Casodex 150 koostisainete suhtes:**

Üks tablett sisaldab laktoosmonohüdraati ja titaandioksiidi, mis võib põhjustada probleeme vähestele patsientidele, kes on nende suhtes ülitundlikud.

#### **Kasutamine koos teiste ravimitega:**

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Kindlasti peab teie arst teadma, kui kasutate mõnda järgnevatest ravimitest:

- antikoagulandid (vere hüübimise vastased ravimid)

- allergiavastased ravimid (nagu terfenadiin või astemisool)
- tsisapriid (ravim seedehäirete raviks)
- tsüklosporiin (ravim immuunsüsteemi pärssimiseks)
- kaltsiumikanali blokaatorid (kõrge vererõhu ja südamehaiguste raviks).

Kui lähete haiglasse ravile, teavitage meditsiinipersonali sellest, et te kasutate Casodex 150. Katkestage oma ravi ainult pärast kooskõlastust arstiga.

### 3. KUIDAS CASODEX 150 KASUTADA

Võtke Casodex 150 alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus täiskasvanuile on üks tablett ööpäevas.

Neelake tablett ilma närimata, koos veega.

Püüdke tabletti võtta iga päev samal ajal, see aitab teil selle võtmist meeles pidada.

Kui teil on tunne, et Casodex 150 toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

#### **Kui te kasutate Casodex 150 rohkem kui ette nähtud:**

Kui olete manustanud tavalisest suurema koguse ravimit, võtke ühendust oma arsti või lähima haiglaga.

#### **Kui te unustate Casodex 150 kasutada:**

Kui olete unustanud ravimit võtta, ärge võtke topeltannust, vaid järgige tavalist manustamiskava.

Ärge katkestage oma-algatuslikult tablettide võtmist, isegi kui tunnete ennast hästi. Ravi tuleb katkestada ainult arsti korraldusel.

### 4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Casodex 150 põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Casodex 150 puhul võivad need olla järgmised:

Väga sageli (rohkem kui ühel patsiendist kümnest) esinevad:

- lööve
- rinnanäärmete valulikkus või suurenemine meestel
- väsimus.

Sageli (rohkem kui ühel patsiendist sajast ning vähem kui ühel patsiendil kümnest) esinevad:

- kehvvveresus (aneemia)
- söögiisu vähenemine
- depressioon
- pearinglus
- unisus
- kuumahood
- kõhuvalu
- kõhukinnisus
- seedehäired
- kõhupuhitus
- iiveldus
- naha ja silmade kollasus (ikterus). See võib viidata maksa kahjustusele.
- sügelus
- naha kuivus
- veri uriinis

- impotentsus
- kehakaalu tõusvalu rinnus
- turse
- libiido langus ja viljakuse vähenemine
- juuste väljalangemine ja karvakasvu vähenemine
- liigkarvakasv või nahakarvade ja juuste uuesti kasv.

Aeg-ajalt (rohkem kui ühel patsiendil tuhandest ning vähem kui ühel patsiendil sajast) esinevad:

- tõsine õhupuudustunne või äkiline õhupuudustunde süvenemine, tavaliselt kaasneva kõha või palavikuga. Mõnedel Casodex 150 kasutataval patsientidel võib tekkida kopsudes põletik, mida nimetatakse interstitsiaalseks kopsupõletikuks (e kopsupõletik, millele on omased väikesed laialtlevinud põletikukolded kopsukoos)
- ülitundlikkus reaktsioonid, sealhulgas tugev naha sügelemine või näo, huulte, keele ja/või kõri turse, mis võib põhjustada neelamisraskusi

Harva (rohkem kui ühel patsiendil 10000-st ning vähem kui ühel patsiendil tuhandest) esinevad:

- maksapuudulikkus

Casodex 150 mg kasutamisega võivad kaasnedada muutused verepildis, mistõttu võib osutada vajalikuks vereanalüüside tegemine.

Ärge ehmuge võimalike kõrvaltoimete loetelust. Teil ei pruugi neist ühtegi tekkida.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

## 5. CASODEX 150 SÄILITAMINE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Hoida originaalpakendis.

Ärge kasutage Casodexi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

## 6. LISAINFO

**Mida Casodex, 150 mg sisaldab:**

- Toimeaine on bikalutamiid.
- Abiained: Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat, povidoon, karboksümetüülamiidoon-naatrium. Kate: hüpromelloos, makrogool 300, titaandioksiid.

**Kuidas Casodex 150 välja näeb ja pakendi sisu**

**Casodex 150, õhukese polümeerikattega tabletid**

Casodex 150 on valget värvi tablett.

PVC/alumiiniumfoolium blistris.

Pakendis 28 tabletti.

**Müügiloa hoidja:**

AstraZeneca UK Ltd.

Stanhope Gate 15  
London W1K 1LN  
Ühendkuningriik

**Tootjad:**

Corden Pharma GmbH  
Otto-Hahn Strasse  
68723 Plankstadt  
Saksamaa

AstraZeneca UK Ltd.  
Silk Road Business Park, Macclesfield  
Cheshire SK10 2NA  
Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AstraZeneca  
Järvevana tee 9  
11314 Tallinn  
Tel: 6549 600

**Infoleht on viimati kooskõlastatud oktoobris 2009**