

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE
Rhinocort Aqua, 64 mikrogrammi/annuses, ninasprei, suspensioon
Budesonidum

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Rhinocort Aqua ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Rhinocort Aqua kasutamist
3. Kuidas ravimit Rhinocort Aqua kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Rhinocort Aqua säilitamine
6. Lisainfo
7. Kasutamishügieen

1. MIS RAVIM ON RHINOCORT AQUA JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Rhinocort Aqua on pump-pihusti, mis sisaldab ravimit - budesoniidi.

Rhinocort Aqua kuulub ravimite hulka, mida nimetatakse glükokortikosteroidideks ja mis vähendavad põletiku nähtusid.

Rhinocort Aqua vähendab põletiku nähte ja hoiab ära põletiku tekkimist ning nina limaskesta paistetust.

Rhinocort Aqua't kasutatakse sesoonse allergilise riniidi ("heinapalaviku"), samuti aastaringse allergilise riniidi raviks ja ennetamiseks ning ninapolüüpide sümptomaatiliseks raviks.

Rhinocort Aqua't tuleb kasutada regulaarselt, nii nagu arst on ette kirjutanud.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE RHINOCORT AQUA KASUTAMIST

Ärge kasutage Rhinocort Aqua't:

- kui te olete ülitundlik (allergiline) budesoniidi või Rhinocort Aqua mõne koostisosa suhtes.

Rääkige oma arstile, kui teil on esinenud ebatavalisi reaktsioone budesoniidi või mistahes Rhinocort Aqua koostises oleva aine suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Rhinocort Aqua:

- kui teil on või on olnud tuberkuloos või maksahaigus,
- kui teil on nina seeninfektsioon või herpes.

Rasedus ja imetamine

Kui olete rase või imetate last rinnapiimaga, peate alati olema ettevaatlik ravimite kasutamisel. Ei ole mingeid tõendeid, et Rhinocort Aqua kasutamine oleks avaldanud kahjulikku toimet nii emale kui ka lapsele, kuid siiski tuleb ravimi manustamisest raseduse ajal hoiduda.

Kui olete rasestunud Rhinocort Aqua kasutamise ajal, võtke niipea kui võimalik oma arstiga ühendust.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Ravim ei oma toimet autojuhtimise või masinate käsitlemise võimele.

Kasutamine koos teiste ravimitega:

Teavitage oma arsti kõigist teistest ravimitest, mida kasutate, eriti kui kasutate seeninfektsioonide vastaseid ravimeid (nt ravimit nimega ketokonasool).

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rhinocort Aqua on mõeldud ainult teie praeguse haiguse raviks. Ärge kunagi kasutage seda ravimit mingi muu haiguse raviks kui just arst pole nii soovitanud. Ärge kunagi andke ravimit kellelegi teisele.

3. KUIDAS RAVIMIT RHINOCORT AQUA KASUTADA

Annustamine on individuaalne. Täitke oma arsti ettekirjutusi täpselt, need võivad erineda selles infolehes kirjutatust.

Enne kui asute Rhinocort Aqua't esimest korda manustama, on oluline, et loeksite läbi

Kasutamishuendi. Huend selgitab teile, kuidas kasutada pihustuspumpa. Järgige juhendit hoolikalt.

Riniit

Täiskasvanud ja üle 6-aastased lapsed: soovitatav algannus on 256 mikrogrammi ööpäevas. Annuse võib manustada 1 kord ööpäevas (hommikul) või kaheks osaks jagatuna (hommikul ja õhtul). Nt 128 mikrogrammi (2 x 64 mikrogrammi) kumbagi ninasõõrmesse hommikul või 64 mikrogrammi kumbagi ninasõõrmesse hommikul ja õhtul.

Pärast riniidi nähtude vähenemist võib arst ravimi annust vähendada.

Nina polüüptide ravi ja profülaktika. Soovitatav annus on 256 mikrogrammi ööpäevas. Annuse võib manustada korraga hommikul või jagatuna kaheks (hommikul ja õhtul). Pärast soovitud toime saavutamist võib arst ravimi annust vähendada.

Rhinocort Aqua ei taga sümptomite kohest leevenemist. Vahel ilmneb sümptomite leevenemine alles 5...7 tundi pärast ravi alustamist. Rhinocort'i täieliku ravitoime ilmnemiseks kulub vähemalt paar päeva (mõnikord kuni 2 nädalat).

Kui teil on hooajaline allergiline riniit ("heinapalavik"), peaksite ravi alustama mõned päevad enne allergilise perioodi algust.

Nina limaskestast tõsise turse korral võib arst pidada vajalikuks kasutada täiendavalt turset alandavat ravimit (nn vasokonstriktorit).

Rhinocort Aqua ei leevenda allergia ilminguid silmades. Kui silmakaebused muutuvad häirivateks, võib arst soovitada teil kasutada silmade sümptomite leevendamiseks teisi ravimeid.

Lapsed tohivad Rhinocort Aqua't kasutada ainult täiskasvanute järeelvalve all, see kindlustab ravimi korrektse ja arsti poolt ette kirjutatud annuse manustamise.

Kasutage ravimit Rhinocort Aqua alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Kui te kasutate ravimit rohkem kui ette nähtud:

Kui Rhinocort Aqua't kasutatakse ühekordselt liiga suures koguses, siis ei teki ohtlikke kõrvalnähte.

Kui te unustate ravimit kasutada:

Kui te unustasite ühe korrapärase manustamiskorra, ei ole vajalik seda hiljem tagantjärele teha. Pihustage järgmine annus nii nagu teile on määratud.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Rhinocort Aqua põhjustada kõrvaltoimeid.

Tavaliselt ei kaasne Rhinocort Aqua kasutamisele ebasoovitavaid kõrvaltoimeid. Tekkivad kõrvaltoimed on tavaliselt möödukad ja kestavad lühikest aega. Teatage kindlasti oma raviarstile kui teil tekib mõni alljärgnevatest kõrvaltoimetest:

Sagedased kõrvaltoimed (rohkem kui ühel patsiendist sajast ning vähem kui ühel patsiendil kümnest):

- Lokaalne ärritus, veidi verine ninaeritis, ninaverejooks.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: (rohkem kui ühel patsiendil tuhandest ning vähem kui ühel patsiendil sajast):

- Ülitundlikkusreaktsioonid nt angioödeem e lokaalne nahaturse.

- Nõgestõbi, lööve, nahapõletik, kihelus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed: (vähem kui ühel patsiendil kümnest tuhandest):

- Ninavaheseina mulgustumine, nina limaskesta haavandumine.

Ligikaudu 5% patsientidest võib kogeda lokaalseid ärritusnähte.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. RHINOCORT AQUA SÄILITAMINE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Mitte lasta külmuda!

Ärge kasutage Rhinocort Aqua't pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja lõppu.

Pärast kasutamist asetage pruun kaitsekork alati Rhinocort Aqua pudelile tagasi.

6. LISAINFO**Mida Rhinocort Aqua sisaldab:**

- **Toimeaine** on budesoniid.
- **Abiained** on mikrokristalne tselluloos, karmelloosnaatrium, veevaba glükoos, polüsorbaat 80, dinaatriumedetaat, kaaliumsorbaat (E202), vesinikkloriidhape, puhastatud vesi.

Kuidas Rhinocort Aqua välja näeb ja pakendi sisu:

Rhinocort Aqua 64 mikrogrammi/annuses: üks pihustus sisaldab 64 mikrogrammi budesoniidi.
Pakendi suurus: Pihusti pudel sisaldab 120 annust ravimit.

Müügiloa hoidja/Tootja:

AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje, Rootsi

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AstraZeneca, Järvevana tee 9, 11314 Tallinn
Tel: +372 6549 600

Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2007

7. KASUTAMISJUHEND

Lugege infolehte enne Rhinocort Aqua ninasprei kasutamist. Kasutamisel järgige hoolikalt allpool toodud instruksioone.

NB! Enne Rhinocort Aqua ninasprei esmakordset kasutamist loksutage pihustuspudelit mõned korrad ja seejärel pihustage 5...10 korda õhku kuni ühtlase ravimijoa saamiseni (vt joonist). Kui te ei kasuta ravimit igapäevaselt, tuleb pihustit jälle laadida. Edasisel kasutamisel piisab ühest õhku pihustusest.

Nuusake nina.
Loksutage pudelit.
Eemaldage pruun kaitsekork.

Hoidke pudelit nii nagu on näidatud joonisel.

Asetage pihusti otsik ninasõõrmesse ning pihustage vajalik kord annuseid. Samamoodi manustage ravimit ka teise ninasõõrmesse.

Asetage pruun kaitsekork tagasi. Ärge kasutage Rhinocort Aqua't sagedamini, kui teile on määratud.

Puhastamine

Puhastage pealmisi plastikosi regulaarselt. Eemaldage nii pruun kaitsekork kui valge ninaotsik. Peske plastikosid soojas vees. Enne tagasi panemist laske plastikosadel õhu käes täielikult ära kuivada.

Ärge püüdke puhastada pihusti otsikut nõela või terava esemega.